

کالآزار (بیماری عفونی)



کالآزار بیماری عفونی، انگلی است که در 98 درصد موارد در کودکان زیر 10 سال دیده می شود و مرگ و میر این بیماری را حدود 95-90 درصد تخمین می زنند. کالآزار یا لیشمانیوز احشایی که در اثر تک یاخته ای به نام لیشمانیا اینفانتوم در انسان و بعضی از حیوانات (سگ، روباه، شغال، گرگ و جوندگان) ایجاد می گردد، در ایران به عنوان بیماری کودکان به شمار می رود و در صورتیکه تشخیص و درمان به موقع انجام گیرد مرگ و میر به 10 درصد و یا کمتر تقلیل پیدا می کند.

این بیماری بوسیله انواع بخصوصی از پشه خاکی ماده به انسان و حیوانات منتقل می گردد. پشه های خاکی پس از خونخواری از حیوان مبتلا تعدادی از ماکروفاژهای آلوده به انگل را وارد معده خود می کنند و پس از گذشت 9-15 روز تمامی انگل های خورده شده به شکل تازکدار در می آیند و همراه با نیش پشه خاکی آلوده به انسان خصوصاً بچه ها انتقال می یابند. وی افزود: پشه های خاکی حشرات کوچکی هستند به اندازه 2-4 میلی متر به رنگ خاکی، بدن پر مو و چشمان بزرگ و پشتی قوز کرده و پاهای باریک و بلند. در حال حاضر این بیماری از تمامی استانهای کشور گزارش شده است اما در دو استان اردبیل و فارس به صورت بومی (اندمیک) دیده می شود.

علائم این بیماری به طور متوسط 3-6 ماه پس از گزش پشه آلوده ظاهر می شود. این بیماری با علائمی از قبیل تب های نامنظم، بزرگی شکم، بزرگ طحال و گاهی کبد کم خونی و رنگ پریدگی، ضعف، بیحالی و لاغر می شود.

در صورتیکه تشخیص و درمان به موقع انجام نشود معمولاً 95-90 درصد مبتلایان در اثر خونریزی های مغزی و یا گوارشی و نیز عفونت های مختلف تلف می شوند اما در صورت تشخیص و درمان به موقع مرگ و میر بسیار کم می شود. درمان این بیماری بایستی تحت نظر پزشک انجام شود و از جمله راه های پیش گیری مبارزه با این بیماری خودداری از تجمع هر گونه مواد زاید در داخل و بیرون منازل و جمع آوری و دفع صحیح زباله، ترمیم و مرمت شکافهای موجود در دیوارها و سقف منازل، بهسازی و ترمیم شکافهای موجود در کف و سقف محل زندگی دام ها، انتقال فضولات دام ها به خارج از روستا و جداسازی اصطبل حیوانات و لانه سگها از مساکن انسانی و استفاده صحیح و منظم از حشره کش ها خصوصاً ددت جهت مبارزه با پشه خاکی ها است