

بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان و نام پدیدآور: احیای پایه کودکان و شیرخواران / مؤلفین سید حامد برکاتی... [و دیگران]. قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۳. مشخصات ظاهری: ۳۲ ص؛ مصور (رنگی)؛ ۲۲ × ۲۹ س.م.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۲-۵۸-۴

وضعیت فهرست نویسی: قیپا

یادداشت: مؤلفین سید حامد برکاتی، مجید خادمیان، امیرحسین جعفری روحی، علیرضا سبزواری، بهاره یغمایی، منیر سادات میرسید علیان.

موضوع: احیای قلبی و ربوی برای کودکان / احیای قلبی و ربوی برای نوزادان

شناسه افزوده: برکاتی، سید حامد - ۱۳۴۵

ردہ بندی کنگره: RJ۳۷۰.۳ ۱۳۹۳ الف /

شماره کتابشناسی ملی: ۳۶۷۸۳۴۳

ردہ بندی دیوبی: ۹۲۱.۲۵/۶۱۸

احیای پایه کودکان و شیرخواران

مؤلفین: دکتر سید حامد برکاتی، دکتر مجید خادمیان
دکتر امیرحسین جعفری روحی، دکتر علیرضا سبزواری
دکتر محمد اسماعیل مطلق، دکتر بهاره یغمایی، منیر سادات میرسید علیان
ناشر: اندیشه ماندگار

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۲-۵۸-۴

تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول - پاییز ۱۳۹۶



انتشارات اندیشه ماندگار

قم - خیابان صفائیه (شهدا) - انتهای کوی بیگدلی
نیش کوی شهید گلدوست - پلاک ۲۸۴
تلفن: ۰۲۵/۳۷۷۴۲۱۴۲ - ۳۷۷۴۶۱۶۵



احیای پایه کودکان و شیرخواران

ویژه پرسنل بهداشتی، درمانی و مراقبین کودک

کمیته کشوری احیای کودکان

۱۳۹۶

سپاسگزاری

با تشکر و قدردانی از اعضای محترم کمیته کشوری احیای کودکان (به ترتیب حروف الفبا)

۴

- دکتر سید حامد برکاتی متخصص کودکان - مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
- دکتر امیرحسین جعفری روحی فوق تخصص ریه کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- دکتر سید عباس حسنی متخصص طب اورژانس عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
- دکتر سعیده حق بین فوق تخصص اورژانس اطفال PICU - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- دکتر قمرتاج خان بابایی فوق تخصص ریه کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر مجید خادمیان متخصص کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- دکتر غلام رضا خادمی متخصص کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دکتر حجت درخشنان فر فوق تخصص اورژانس اطفال - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر سید سجاد رضوی متخصص بیهوشی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- اکرم رضائیان فوق لیسانس پرستاری - عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دکتر آنیتا سبز قبایی متخصص طب اورژانس - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر علیرضا سبز زواری فلوشیپ بیهوشی اطفال - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دکتر مجید سزاواری فوق تخصص کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دکتر حسین سعیدی متخصص کودکان، فلوشیپ اورژانس کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
- دکتر مجید شجاعی متخصص طب اورژانس - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر میثم شریف زاده فلوشیپ مراقبت ویژه کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر زهرا صراطی شیرازی فوق تخصص PICU - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- دکتر محمد تقی طالبیان متخصص طب اورژانس - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر محمد رضا مدرسی فوق تخصص ریه کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر محمد اسماعیل مطلق متخصص کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
- دکتر الهه ملکان راد فوق تخصص قلب کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر مسعود محمد پور فلوشیپ مراقبت ویژه کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- منیرالسادات میر سید علیان فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - کارشناس ارشاد اداره سلامت کودکان
- دکتر بهاره یغمایی فلوشیپ مراقبت ویژه کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران



فهرست

۷ مقدمه
۸ زنجیره بقای کودک
۵ زنجیره بقا
۸ پیشگیری از ایست های قلبی - تنفسی
۹ CAB یا ABC
۱۱ ترتیب احیای پایه برای احیاگر غیر حرفه ای
۱۷ نیاز کودک به احیا را بررسی نمایید
۱۸ تنفس و نبض را چک کنید
۱۸ تنفس ناکافی همراه با وجود نبض
۱۸ برادیکاردی با پروفیوژن ناچیز
۱۹ ماساژ قلبی
۲۰ تهییه
۲۰ تهییه هماهنگ با ماساژ قلبی
۲۰ شوک الکتریکی
۲۱ احیا فقط با دست (فقط ماساژ)
۲۲ وسایل کمکی در تنفس
۲۳ احتیاطات
۲۴ تهییه بگ - ماسک (دو نفره)
۲۴ باد شدن معده و فشردن کریکوئید
۲۵ تجویز اکسیژن
۲۵ ماسک های اکسیژن
۲۵ کانول بینی
۲۶ انسداد راه هوایی با جسم خارجی (خفگی)
۲۶ رفع انسداد راه هوایی
۲۸ حادثه
۲۹ غرق شدگی
۳۰ ضمیمه



مقدمه

عملیات احیای قلبی ریوی سریع می‌تواند میزان بقای عمرناشی از ایست قلی را در کودکان بهبود بخشد. متاسفانه تعداد زیادی از کودکان نیازمند، احیای با کیفیت بالا را دریافت نمی‌کنند. باید علاوه بر افزایش کیفیت عملیات احیای انجام شده توسط افراد حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای، تعداد افراد غیرحرفه‌ای که احیا را آموزش می‌بینند نیز افزایش دهیم. عملیات احیا سریع و مؤثر توسط یک ناظر (اعم از والدین، مراقبین و یا هر فرد بزرگسال آموزش دیده حاضر در صحنه)، می‌تواند منجر به برگشت موفق خودبخودی گرددش خون و زنده ماندن کودک آسیب دیده با وضعیت عصبی سالم گردد.

کتاب حاضر و لوح فشرده فیلم آموزشی مربوطه با همکاری تعدادی از اساتید کمیته کشوری احیای کودکان توسط اداره سلامت کودکان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس تهیه گردیده است. جا دارد از تشریک مساعی کلیه اعضای کمیته کشوری احیای کودکان بویژه جناب آقای دکتر امیرحسین جعفری روحی، سرکار خانم دکتر سعیده حق بین، جناب آقای دکتر دکتر غلامرضا خادمی، جناب آقای دکتر مجید خادمیان، جناب آقای دکتر علیرضا سبزواری، سرکار خانم دکتر زهرا صراتی شیرازی و سرکار خانم دکتر بهاره یغمایی کمال قدردانی و سپاسگذاری را داشته باشم.

دکتر سید حامد برکاتی

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

زنجیره بقا کودک

به منظور برخورداری از بالاترین میزان بقا و بهبود کیفیت زندگی، احیای کودکان جزیی از یک تلاش اجتماعی محسوب می‌شود. تلاشی که از پیشگیری شروع می‌شود. این پیشگیری بسیار مهم است و گستره وسیعی از سیاست‌های ملی در زمینه مقررات ترافیکی، نحوه مراقبت از کودکان سرنشین اتومبیل تا یمنی محیط‌های اجتماعی همچون محل بازی کودکان، مهدکودک‌ها و مدارس و اینمنی منزل را در بردارد. در این زمینه آموزش والدین و مراقبین کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بعد از پیشگیری و در فرایند کودکی که نیازمند احیا است، سلسله اقداماتی از جمله احیای سریع قلبی ریوی، دستیابی سریع به خدمات سرویس اورژانس، انجام اقدامات احیای پیشرفته و نهایتاً مراقبت‌های تخصصی و فوق تخصصی بعد از ایست قلبی مورد نیاز است. این سلسله اقدامات در مجموع زنجیره بقا یا حیات کودک نامیده می‌شوند.



شکل ۱: زنجیره بقا کودکان

زنجیره بقا

۱. پیشگیری
۲. احیای قلبی ریوی زودهنگام
۳. دسترسی سریع به خدمات اورژانس
۴. ارائه سریع احیاپیشرفت
۵. مراقبت‌های جامع بعد از ایست قلبی

سه حلقه اول این زنجیره، احیای پایه کودکان را تشکیل می‌دهد (شکل ۱) که اقدامات دوم و سوم آن به طور عمدۀ مورد بحث این کتابچه است. اقدام/حلقه اول این زنجیره پیشگیری می‌باشد که به دلایل گفته شده در ادامه مطلب مهم‌ترین اقدام در کاهش مرگ و میر کودکان به ویژه به دلیل سوانح و حوادث است و درسته جامعی که توسط اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت تدوین گردیده، در ۳ سطح (مریضی/والدین و مراقبین/کودکان) به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

پیشگیری از ایست‌های قلبی - تنفسی

در شیرخواران (کودکان کوچکتر از یکسال)، ناهنجاری‌های مادرزادی، عوارض ناشی از



نارس بودن و سندروم مرگ ناگهانی شیرخوار در راس علل مرگ و میر قرار دارد. در کودکان بزرگ ترازیک سال بر اساس آمارهای کشوری و نیز آمارهای جهانی، مصدومیت ناشی از سوانح و حوادث علت اصلی مرگ را به خود اختصاص می‌دهد. سهم مرگ کودکان ناشی از سوانح و حوادث در مقایسه با سایر علل آن با فرازیش سن بیشتر می‌شود. به ۹ دنبال ایست های قلبی ناشی از سوانح و حوادث بقای کودکان کم است. این موضوع خود اهمیت و تاکید بر پیشگیری از آسیب ها را در کاهش مرگ و میر می رساند. حوادث وسائل نقلیه موتوری شایع ترین علت آسیب های منجر به فوت در کودکان می باشد و با مداخلات هدفمند نظری استفاده از صندلی های ایمنی مسافرتی کودکان، می توان خطر این مرگ و میر را کاهش داد. اقداماتی همچون وضع قوانین ترافیکی خاص کودکان، استفاده از صندلی ایمن و استاندارد کودک در اتومبیل و رعایت استانداردهای ایمنی در هر محیطی که محل آمد و شد کودکان و محل رشد آن ها است، می تواند به مقدار زیادی خطر مرگ ناشی از سوانح و حوادث در کودکان را کاهش دهد. اطلاعات مناسبی در این زمینه دروب سایت^۱ آموزش عمومی اداره سلامت کودکان (کودک سالم) به آدرس و نیز سایت سازمان بهداشت جهانی به آدرس <http://childhealth.behdasht.gov.ir> موجود است.

CAB یا ABC

کودک نیازمند احیا در تامین اکسیژن بافت های انتهایی و به ویژه بافت عصبی دچار مشکل است. به عبارت دیگر تامین اکسیژن کافی توسط ریه ها و توزیع آن در بدن توسط جریان خون و به کمک ضربان قلب، دچار مشکل شده است. بر همین اساس ۳ اصل عمده در احیای پایه کودک اهمیت دارد:

- دریافت اکسیژن توسط بافت ریه از طریق راه هوایی (A:Airway)،
- تامین اکسیژن از طریق تنفس و تهویه موثر: تنفس / تهویه مکانیکی (B:Breathing)،
- توزیع اکسیژن در بدن توسط گردش خون به کمک ضربان موثر قلب و گردش خون (C:Circulation or Chest Compressions).

ترتیب انجام عملیات احیا قبل از بصرت ABC معرفی می گردید. ولی در حال حاضر

۱. این وبسایت در دست طراحی است.

با توجه به شواهد حاصل از مطالعات متعدد، توالی CAB (ماساژ قلبی، راه هوایی، تنفس و تهویه) توصیه می‌شود. این بدان معناست که اولین اقدام در مواجهه با کودکی که دچار ایست قلبی تفسی شده است، ماساژ قلبی است.

به عبارت دیگر در طی ایست قلبی، یک احیای با کیفیت مطلوب و به ویژه ماساژ قلبی با کیفیت بالا برای ایجاد جریان خون به ارگان‌های حیاتی نقشی مهم و اساسی دارد و در صورت انجام صحیح، در بسیاری از موارد منجر به بازگشت خودبخودی گردش خون^۱ می‌شود.

برخی از دلایل انتخاب توالی CAB نسبت به توالی قبلی ABC عبارتند از:
 در توالی CAB احیاگران پس از آموزش قادر به شروع سریع ماساژ قلبی خواهند بود؛ در حالی که وضعیت دادن به سرو استفاده مطلوب از ماسک یا بگ و ماسک و یا تنفس دهان به دهان که به طور مناسبی انجام شود، برای احیاگر زمان بر بوده و شروع ماساژ را به تاخیر خواهد انداخت و طبیعتاً این کار در اولویت بعدی قرار خواهد گرفت.
 همچنین بیشتر مصدومینی که نیازمند CPR می‌شوند، بالغینی هستند که دچار ایست قلبی بصورت فیبریلاسیون بطنی^۲ شده‌اند که در اینها ماساژ قلبی نسبت به تنفس دادن از اهمیت بالاتری برخوردار است. این افراد در صورتی که ماساژ قلبی در آنها هرچه سریع تر شروع شده و حداقل وقفه در آن ایجاد شود، سرانجام بهتری خواهند داشت.

به منظور سهولت آموزش احیا برای فراغیران و قابلیت اجرای بیشتر آن توسط ناظرین، برای کودکان و شیرخواران نیز شروع احیا با توالی CAB توصیه شده تا شناس دریافت آن در تعداد بیشتری از مصدومان با ارست قلبی ناگهانی بالا برود. همچنین ارائه آموزش یکسان احیا به احیاگران (احیا جهت بالغ؛ کودک و یا شیرخوار) از فواید شروع احیا با ترتیب CAB می‌باشد.

قابل ذکر است که ایست‌های قلبی در بچه‌ها و شیرخواران عمدتاً ناشی از مشکلات اولیه تنفسی هستند (تابیماری اولیه قلبی کودک) ولذا برقراری تهویه هم در احیای کودکان بسیار مهم است ولی شروع احیای با ماساژ قلبی (۳۰ ماساژ) و بدنال آن



تنفس کمکی، به طور تئوریک در احیای یک نفره شروع تهویه ریوی را فقط حدود ۱۸ ثانیه و در احیای دو نفره در زمان کوتاهتری به تاخیر می‌اندازد. ترتیب CAB در احیای پایه کودکان و شیرخواران نیز توصیه می‌شود تا آموزش آن ساده‌تر باشد و در نتیجه قربانیان بیشتری احیای قلبی ریوی استاندارد را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است که در دستورالعمل‌های احیای کودکان، شیرخوار به اطفال کمتر از یک‌سال و کودک از یک‌سال تا دوران بلوغ اطلاق می‌گردد. در همین راستا و به منظور سهولت آموزش و انجام عملیات استاندارد، نشانه بلوغ، ایجاد جوانه پستانی در دختران و ظهور موهای زیر بغل در کودکان پسر می‌باشد.

ترتیب احیای پایه برای احیاگر غیرحرفه‌ای

در این راهنمای سری از مهارت‌ها به صورت متوالی و مرحله به مرحله مشخص شده است^۱:

۱. ارزیابی ایمنی فرد احیاکننده و کودک مصدوم
۲. ارزیابی نیازمندی کودک به احیا با بررسی پاسخ‌دهی مصدوم
۳. ارزیابی نبض مرکزی و تنفس کودک
۴. شروع فشردن قفسه سینه (ماساز قلبی)
۵. باز کردن راه هوایی و تهویه دادن
۶. هماهنگی بین فشردن قفسه سینه و تنفس
۷. اطلاع‌رسانی به سیستم اورژانس

۱. ایمنی فرد احیاکننده و کودک مصدوم

همیشه قبل از هرگونه اقدامی از ایمنی محل احیا برای خود و مصدوم اطمینان حاصل نمایید. به طور تئوریک انجام عملیات احیا با خطر انقال بیماری‌های عفونی همراه است؛ اما براساس بررسی‌های انجام شده خطر خیلی کمی متوجه فرد احیاکننده می‌باشد.

۱. تعدادی از این موارد در صورتی که بیش از یک احیاکننده وجود داشته باشد، می‌تواند بصورت همزمان انجام گردد. (مثلاً شروع عملیات احیا و اطلاع‌رسانی به سرویس اورژانس)

۲. بررسی نیاز به احیا و پاسخ دهنده مصدوم

به مصدوم ضربات آهسته‌ای بزنید و با صدای بلند حالت را جویا شوید، «حال خوبه؟» اگر اسم کودک رامی دانید اورابه اسم صدا بزنید. اگر کودک حالت پاسخ دهنده^۱ داشته باشد، پاسخ داده، جابجا شده و یا ناله خواهد کرد.

۱۲

هر زمانی که با کودک مصدومی که پاسخی به تحریکات نداده و نفس نمی‌کشد و یا تنفس غیر موثر دارد (حرکات متناسب باز کردن دهان شبیه دم زدن و نفس کشیدن که تنفس موثر محسوب نمی‌شود؛ دهنک زدن)^۲ مواجه شدید، باید بنا را بروجود ایست قلبی بگذارید.

به سرعت وجود هرگونه آسیبی را که ممکن است به کمک شما نیاز داشته باشد را ارزیابی کرده و نیاز به مداخله پزشکی را بررسی کنید. در صورتی که کودک در حال نفس کشیدن است، ابتدا اورژانس را خبر کرده و سپس سریعاً بر بالین وی بازگشته و وضعیت کودک را مجدداً و مکرراً ارزیابی نمایید. از آنجایی که کودکان دچار مشکل تنفسی، خود به خود وضعیتی می‌گیرند که بهترین حالت برای بازنگه داشتن راه هوایی بوده و بیشترین تهווیه را در آن وضعیت برایشان میسر می‌کند، اجازه دهید کودک دچار مشکل تنفسی در وضعیتی که در آن راحت است، بماند. اگر در ارزیابی ابتدایی کودک، پاسخی از اوندیدید (بدون پاسخ)^۳، با فریاد کمک بخواهد.

۳. تنفس را ارزیابی کنید

در صورتی که مصدوم تنفس منظم دارد، نیازی به عملیات احیا ندارد و نباید ماساژ قلبی را شروع کنید. در این صورت و اگر شواهدی از حادثه و آسیب وجود ندارد، کودک را بروی یک پهلو بخوابانید تا ضمن کمک به بازنگه داشتن راه هوایی، خطر خفگی نیز کاهش یابد.

اگر کودک تنفس نداشته و پاسخ نمی‌دهد و یا تنفس غیر موثر داشت (دهنک زدن)^۴، عملیات احیا را شروع کنید. برخی اوقات مصدومی که نیاز به احیا دارد، دهنک می‌زند که بطور غلط به عنوان تنفس در نظر گرفته می‌شود. یک احیاگر باقیستی قادر

۱. Responsive.

۲. دهنک زدن: Gasping.

۳. Unresponsive: بدون پاسخ.

۴. Gasping: دهنک زدن.



به افتراق تنفس غیرمثر از تنفس طبیعی خودبخودی بوده و طی دوره‌های آموزشی احیا و همچنین توسط سیستم اورژانس به احیاگر حاضر در صحنه، چگونگی این افتراق آموزش داده شود. احیاگر باید بداند که عملیات احیا هر زمان که با کودک مصدومی مواجه شده باشد که پاسخ به تحریکات ندارد (ولو این که تنفس غیرمثره صورت ۱۳ دهنک زدن‌های گاه به گاه داشته باشد)، باید انجام شود.

۴. شروع فشردن قفسه سینه (ماساژ قلبی)

در ایست قلبی، فشردن موثر و مطلوب قفسه سینه موجب برقراری جریان خون به ارگان‌های حیاتی می‌شود. در صورتی که شیرخوار یا کودک به تحریکات پاسخ نمی‌دهد و تنفس ندارد، ۳۰ ماساژ قلبی به او بدھید.

موارد ذیل خصوصیات یک عملیات احیا با کیفیت بالا و مطلوب است:

فشردن قفسه سینه با سرعت و تعداد مناسب و عمق کافی.

سریع فشار بدھید: با سرعت حداقل ۱۰۰ بار در دقیقه (و حداقل ۱۲۰ بار در دقیقه) ماساژ بدھید.

محکم و قوی فشار بدھید: آن اندازه نیرو وارد کنید که حداقل یک سوم قطر قدامی خلفی قفسه سینه و یا ۴ سانتیمتر (۱/۵ اینچ) در شیرخواران و ۵ سانتی متر (۲ اینچ) در کودکان فشرده شود. (قفسه سینه در نوجوانی حداقل ۵ سانتی مترو نه بیشتر از ۶ سانتی متر فشرده گردد)

اجازه دهید قفسه سینه در فاصله بین دو ماساژ کاملاً برگشت نماید. این کار کمک می‌کند که فشار ماساژ از روی قلب فشرده شده برداشته شود و قلب فرصت داشته باشد تا مجدداً از خون پر شود. از وقفه در روند ماساژ‌های قلبی به هر دلیلی اجتناب کنید. برای دستیابی به بهترین نتیجه، ماساژ قلبی را بروی سطح سخت (غیرقابل ارتجام) دهید.

در احیای شیرخوار، در صورتی که فقط یک نفر احیا کننده (اعم از حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای) وجود داشته باشد، بایستی در شیرخواران جناغ با دو انگشت، که بر روی قسمت تحتانی آن (جناغ) زیر خط فرضی بین دو نیپل قرار گرفته‌اند (شکل ۲)، فشرده

۱. این نکته مهم را باید به یاد داشت که ماساژ قلبی ناکافی و یا غیرمثرحتی در بین احیاگران حرفه‌ای نیز متدائل است.

شود. مراقب باشید بروی دندنهای زائد خنجری استخوان جناغ (زاده گزیفویید) فشار وارد نکنید. فرد احیا کننده بایستی حداقل به اندازه یک سوم عمق قفسه سینه یا در حدود ۴ سانتیمتر (۱/۵ اینچ) فشردگی ایجاد کند.



در احیای کودک، احیا کننده باید نیمه تحتانی جناغ را با پاشنه یک یا هردو دست حداقل باندازه یک سوم قطر قدامی خلفی قفسه سینه یا تقریباً ۵ سانتیمتر (۲ اینچ) فشار دهد. بر روی زائد تחתانی استخوان جناغ (گزیفویید) و یا دندنهای فشار نیاورید.

هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر مزیت هریک از روش‌های ماساژ یک دستی و یا دو دستی و



نتیجه بهتریکی از آن‌ها در دسترس نمی‌باشد. با توجه به اینکه کودکان مصدوم و احیاگران بسته به احیا ممکن است اندازه‌های متفاوتی داشته باشند. بنابراین نکته مهم این است که هر روشی را که بکار می‌بندید، اطمینان حاصل نمایید که ماساژ با عمق کافی داده شده و برگشت قفسه سینه بعد از هر فشردگی کامل می‌باشد.

بعد از هر ماساژ، اجازه دهید قفسه سینه کاملاً برگشت نماید؛ چرا که برگشت کامل آن موجب بهبودی جریان خون بازگشتی به قلب و در نتیجه بهبود جریان خون توزیع شده در بدن، طی عملیات احیا می‌شود.

خستگی احیاگر می‌تواند به کم شدن سرعت ماساژ قلبی، عمق ماساژ و برگشت قفسه صدری بیانجامد. حتی زمانی که احیاگر خستگی را انکار می‌کند، کیفیت ماساژ قلبی ممکن است ظرف دقایقی تحلیل پیدا کند؛ بنابراین وقتی که دو یا بیشتر از دو احیاگر وجود دارد، احیاگران بایستی هر دو دقیقه نقش خود را بصورت چرخشی تعویض نموده تا از خستگی فرد ماساژ دهنده و در نتیجه تحلیل در کیفیت و تعداد ماساژ جلوگیری شود. جابجایی بین نفرات بایستی در حداقل زمان ممکن (کمتر از ۵



ثانیه) انجام گیرد تا حداقل وقفه در ماساژ قلبی ایجاد شود.
در احیا شیرخواران و کودکان در صورتی که ماساژ قلبی با تهویه (تنفس کمکی) همراه باشد، بهترین نتیجه حاصل خواهد شد، ولی در صورتی که یک احیاگر برای تنفس کمکی آموزش ندیده باشد و یا قادر به انجام آن نباشد، بایستی به ماساژ قلبی ۱۵ ادامه دهد تا افراد کمکی برسند.

۵. باز کردن راه هوایی و تهویه (تنفس کمکی) دادن

برای احیا کننده تنها (احیای یک نفره) نسبت ماساژ به تهویه ۳۰:۲ توصیه می‌گردد؛



یعنی به ازای هر ۳۰ ماساژ با کیفیت و موثر باید ۲ تنفس کمکی به کودک داده شود. برای این کار پس از اعمال ۳۰ ماساژ اولیه، راه هوایی را باز کرده و ۲ بار تنفس بدھید.

در شیرخوار یا کودکی که پاسخی به تحریکات نمی‌دهد، زبان ممکن است راه هوایی را مسدود

کرده و مانع تهویه گردد. راه هوایی را می‌توان با استفاده از مانور عقب بردن سرو بالا بردن چانه^۱ هم برای مصدومین و هم بیماران غیرمصدوم انجام داد.^۲

برای تنفس دادن به یک شیرخوار از تکنیک دهان به دهان و بینی و در کودکان از تکیک دهان به دهان استفاده نمایید. مطمئن شوید که تنفس‌ها موثرند (قفسه سینه باید همزمان با تنفس کمکی بالا بباید). هر تنفس بایستی حدود یک ثانیه طول بکشد. در صورتی که قفسه سینه بالا نباید، دوباره به سرو وضعیت داده، مراقب نشت هوا باشید و دوباره تلاش کنید. شاید لازم باشد برقراری بهترین موقعیت و وضعیتی که حداکثر باز بودن راه هوایی را در پی داشته و تنفس موثری ایجاد نماید، سر کودک را در وضعیت‌های مختلف قرار دهید.

در صورتی که در یک شیرخوار، برقراری تماس دهان به دهان و بینی به خوبی مقدور نبوده و نشت هوا وجود داشته باشد، تکیک تنفس دهان به دهان و یا دهان به بینی را امتحان کنید. در تنفس دهان به دهان، بینی کودک را با فشار دادن بسته نگه دارید

.۱ Head tilt–Chin lift .۲

۲. البته برای این کار حتما باید از عدم صدمه به نخاع گردنی اطمینان حاصل کنید.

و در تنفس دهان به بینی، دهان کودک را بسته نگه دارید. در هر حال مطمئن شوید که در هر تنفس قفسه سینه بیمار بالا می‌آید. در صورتی که ماسک در دسترس بود از آن استفاده نمایید. در شیرخواران در صورتی که برای ایجاد یک تماس محکم بین دهان و ماسک مشکلی وجود داشت، تنفس دهان به دهان یا دهان به بینی را امتحان کنید. همانطور که ذکر شد، اگر از روش دهان به دهان استفاده می‌کنید، بینی را و در صورتی که از روش دهان به بینی استفاده می‌کنید، دهان را بیندید.

۶. هماهنگی بین فشردن قفسه سینه و تنفس

در مرحله بعدی و بدون وقفه در عملیات احیا، بعد از دادن ۲ تنفس، سریعاً^{۳۰} ماساژ بدھید. احیاگر تنهای، با یستی دوره‌های ۳۰ ماساژ و ۲ تنفس را برای مدت ۲ دقیقه (تقریباً ۵ دوره) قبل از ترک بیمار به منظور اطلاع رسانی به اورژانس و یا تهیه یک دیفیریلاتور خارجی اتوماتیک^۱ ادامه دهد.

به هر حال باید مطمئن شوید که به هنگام تنفس قفسه سینه بالا می‌آید. اگر عملیات احیا به صورت تک نفره انجام می‌شود با کمترین زمان ممکن در توقف ماساژها بعد از هر ۳۰ ماساژ، دو تنفس کمکی بدھید.

۷. اطلاع رسانی به اورژانس

در صورتی که دو احیاگر وجود دارند، یک نفر با یستی فوراً عملیات احیا را شروع نموده و دیگری سیستم اورژانس را خبر کرده و در صورتی که دیفیریلاتور خارجی اتوماتیک (AED) در دسترس باشد، آن را فراهم نماید. بیشتر شیرخواران و کودکان دچار ایست قلبی، یک ایست ناشی از مشکل اولیه تنفسی دارند تا مشکل قلبی، بنابراین برای احیا کننده تنها، انجام عملیات احیا برای ۲ دقیقه، قبل از فراخوانی اورژانس و تهیه یک AED، توصیه می‌شود. احیاگر تنهای با یستی سریعاً^۲ بر بالین قربانی برگشته و هر چه سریع تر از AED (در صورتی که تهیه کرده باشد) استفاده نموده یا عملیات احیا را با شروع مجدد ماساژ قلبی از سرگیرد. دوره‌های ۳۰ ماساژ و ۲ تنفس را تا رسیدن تیم احیا اورژانس و یا شروع تنفس خودبخودی قربانی ادامه دهد. نحوه و مراحل استفاده از AED در ضمیمه آمده است.



احیای پایه برای احیاکننده‌های ماهر یا هر کسی که آموزش احیای دو نفره دیده است.

احیای پایه برای افراد حرفه‌ای شاغل در مراکز درمانی و سرویس‌های اورژانس شهری بجز تغییرات ناچیزی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، مشابه احیای پایه برای افراد غیر حرفه‌ای است. احیاکننده‌های حرفه‌ای به احتمال زیاد هنگام احیا تنها نخواهند بود و به صورت تیمی این کار را انجام خواهند داد. برخی از فعالیت‌هایی که قبل از این شرح داده شد، در این حالت به صورت هم‌زمان صورت می‌گیرد (همچون ماساژ قلبی و آماده شدن برای انجام تنفس)، به طوری که به هر حال برای ترتیب آن‌ها اهمیت زیادی وجود ندارد.

احیاکننده حرفه‌ای باید ترتیب اقدامات احیا را بر مبنای محتمل ترین دلیل ایست قلبی تنظیم کند. به عنوان مثال اگر ایست قلبی ناگهانی است (به عنوان مثال افتادن ناگهانی کودک یا نوجوان در طی فعالیت ورزشی یا کودکی که از نظر آریتمی پر خطر محسوب می‌شود)، احیاکننده حرفه‌ای باید بنا را براین بگذارد که بیمار دچار یک ایست قلبی ناشی از فیبریلاسیون بطنی^۱ شده است و به محض آنکه متوجه شد چنین کودکی پاسخ پذیر نیست و نفس نمی‌کشد (یا دهنک می‌زند) بایستی سریعاً از اورژانس کمک بخواهد و یک AED تهیه نماید و CPR را شروع کرده و از AED استفاده نماید.

نیاز کودک به احیا را بررسی نمایید

اگر بیمار پاسخ نمی‌دهد و تنها هستید، بلا فاصله برای کمک فریاد زده و سیستم اورژانس را از طریق موبایل یا تلفن (هر کدام که نزدیکتر است^۲)، خبردار کنید. در صورتی که دو نفر و یا بیشتر هستید، برای کمک فریاد بزنید. احیاکننده اول در کنار قربانی باقی می‌ماند، احیاکننده دوم اورژانس را خبر کرده و AED و تجهیزات لازم را فراهم می‌کند.

۱. VF: Ventricular Fibrillation .

۲. با توجه به اینکه تقریباً تمام گوشی‌های موبایل و انواع زیادی از گوشی‌های ثابت مجهز به بلندگو هستند، احیاکننده خواهد توانست در زمان شروع احیا و هم‌مان با عملیات احیا با اورژانس پیش بیمارستانی در ارتباط بوده و لحظه به لحظه وضعیت قربانی را اطلاع داده، راهنمایی‌های لازم را کسب کند و نیاز از زمان رسیدن تیم عملیاتی اورژانس مطلع باشد.



تنفس و نبض را چک کنید^۱

اگر شیرخوار یا کودک پاسخ پذیر نیست و نفس نمی‌کشد (دهنک رانمی توان به حساب تنفس گذاشت)، احیا کننده حرفه‌ای ممکن است ده ثانیه برای جستجوی یک نبض

(براکیال در شیرخواران و کاروتید یا فموزال در کودک) وقت صرف کند. اگر در طی ده ثانیه نتوانست نبض را حس کند یا مطمئن از وجود یک نبض نبود می‌باشد ماساژ قلبی را شروع کند. در بسیاری از موارد در وضعیت اورژانس لمس کردن نبض خیلی سخت است و مطالعات مoid این است که احیاگرهای حرفه‌ای همچون احیاگرهای غیرحرفه‌ای قادر نخواهند بود بطور قابل اعتمادی وجود یا عدم وجود یک نبض را مشخص کنند.

تنفس ناکافی همراه با وجود نبض

اگر با وجود این که نبض قابل لمس بوده و تعداد آن بیش از ۶۰ بار در دقیقه است تنفس ناکافی است، تنفس کمکی را با سرعت ۲۰ تا ۲۰ در دقیقه شروع کنید (هر ۳ تا ۵ ثانیه، یک نفس) و این کار را تا زمانی که تنفس خودخودی برگردد، ادامه دهید (A۳). نبض را هر ۲ دقیقه ارزیابی کنید. توجه داشته باشید که هر بار بیش از ۱۰ ثانیه برای انجام این کار صرف نکنید.

برادیکاردی با پروفیوژن ناچیز

اگر نبض از ۶۰ تا در دقیقه کمتر است و علی‌رغم فراهم کردن اکسیژن‌اسیون و تهییه، کماکان علائمی از گردش خون ناچیز (مثل رنگ پریدگی، ماتلینگ^۲، سیانوز) وجود دارد؛ باید ماساژ قلبی را شروع کرد. با توجه به اینکه برونده قلبی در کودکان و شیرخواران وابسته به ضربان قلب می‌باشد، در صورت وجود برادیکاردی شدید که همراه پروفیوژن ناچیز باشد، باید به کودک ماساژ قلبی داد؛ زیرا ایست قلبی قریب الوقوع

۱. احیاگر هم‌زمان تنفس و نبض کودک را چک می‌کنند.

۲. Moteling Hallتی که پوست بصورت شبکه‌ای و لکه‌شده و عمده‌ناشی از عدم ثبات وضعیت قلبی عروقی است.



بوده و شروع احیا قبل از ایست قلبی کامل منجر به بقای عمر بهتری خواهد بود. عدد مشخصی برای تعداد ضربان قلب که تعیین کننده شروع ماساژ قلبی باشد، مشخص نشده است. توصیه به شروع ماساژ قلبی برای ضربان های کمتر از ۶۰ در صورت وجود پرفیوژن ناچیز تنها بر اساس سادگی آموزش و سهولت به خاطرسپاری آن می باشد.

۱۹

ماساژ قلبی

در صورتی که شیرخوار یا کودک پاسخ نمی دهد، تنفس ندارد و هیچ نبضی ندارد (یا اطمینان ندارید که نبضی وجود دارد)، ماساژ قلبی را شروع کنید (این کار را همان گونه که برای افراد غیرحرفه ای گفته شده است، شروع کنید). تنها تفاوت در ماساژ قلبی ای که توسط افراد حرفه ای انجام خواهد شد، تفاوت در ماساژ شیرخواران است. احیا گر حرفه ای (تنها زمانی که تنها است) برای شیرخواران باید از تکنیک دوانگشتی^۱ استفاده کند.

تکنیکی که دست حلقه می شود و توسط دوانگشت شست ماساژ انجام می شود،^۲ زمانی توصیه می شود که احیا توسط دونفر صورت گیرد. با دو دست قفسه سینه شیرخوار را به صورت حلقه بگیرید. انگشتان خود را در پشت قفسه سینه قرار داده و انگشتان شست راه همراه با هم در یک سوم تھاتانی استرنوم قرار دهید. خیلی محکم با انگشتان شست استرنوم را فشار دهید. در گذشته توصیه می شد که در زمان ماساژ قلبی، قفسه صدری هم فشرده شود، اما اطلاعاتی موجود نیست که مزایای این روش را نشان دهد. روش دو شستی که در آن دست ها دور قفسه صدری قرار می گیرند نسبت به روش دوانگشتی ترجیح داده می شود، زیرا باعث ایجاد گردش خون موثر تر در عروق قلبی^۳

شده و به سبب ثبات و یکنواختی بیشتر در نیروی وارد و عمق فشردگی قفسه سینه، احتمالاً فشار سیستولی و دیاستولی بالاتری را سبب می شود. اگر شما به لحاظ فیزیکی نمی توانید دستان تان را به دور قفسه صدری بیمار حلقه کنید، ماساژ را به روش دوانگشتی بدهید.



۱. finger chest compression technique

۲. Two thumb -encircling hands .

۳. عروق کرونری



تهویه

بعد از دادن ۳۰ ماساژ (در احیای دو نفره، ۱۵ ماساژ)، راه هوایی را با مانور Head tilt – chin lift (chin lift) باز کنید و دو تنفس بدھید. اگر شواهدی از ضربه بوجود آمده باشد، از تکنیک Jaw thrust استفاده کنید.

وجود دارد که امکان آسیب نخاعی مطرح است، از تکنیک Jaw thrust بدون استفاده از Head tilt استفاده کنید. از آنجایی که بازنگه داشتن راه هوایی و برقراری تهویه تنفسی کافی در احیای اطفال مهم است، در صورتی که تکنیک Jaw thrust قادر به باز کردن راه هوایی نبود از مانور Head tilt – chin lift استفاده کنید.

تهویه هماهنگ با ماساژ قلبی

یک احیا کننده تنها از نسبت ۳۰ به ۲ استفاده می کند. برای احیای دو نفره کودکان و شیرخواران در حالی که یک احیا کننده ماساژ قلبی می دهد، احیا کننده دیگر راه هوایی را بازنگه می دارد و تنفس را به نسبت ۱۵ به ۲ می دهد. تنفس کمکی باید با کمترین وقفه ممکن در ماساژ، انجام گیرد. اگر بیمار راه هوایی پیش رفته داشت (لوله گذاری شده بود)، توالی تهویه و ماساژ دیگر کاربردی نخواهد داشت و بدون اینکه برای تنفس کمکی وقفه ای صورت گیرد، ماساژ دهنده حداقل ۱۰۰ ماساژ در دقیقه (و حداقل ۱۲۰ بار در دقیقه) بطور مداوم می دهد. فردی که تنفس کمکی می دهد، ۸ تا ۱۰ تنفس در دقیقه (یک نفس هر ۶ تا ۸ ثانیه) می دهد. باید از دادن تنفس کمکی بیش از حد در شرایط پر استرسی که کودک دچار ایست قلبی است، اجتناب شود.

شوك الکتریکی

بسیاری از AED‌ها و بیزگی‌های قابل توجهی در تشخیص ریتم‌های قابل شوک در کودکان دارند و تعدادی از آن‌ها طوری تعییه شده‌اند تا انرژی خروجی را تاحدی کاهش دهند تا برای شیرخواران و کودکان کمتر از ۸ سال مناسب باشند. هنگامی که احیا کننده حرفه‌ای آموزش دیده، ریتم قابل شوک را در شیرخواری تشخیص داد، استفاده از دفیبریلاتور دستی ارجح است.

AED‌ای که به کاهنده دوز مخصوص کودکان مجهز باشد، در شیرخواران ترجیح داده می شود. به طور کلی برای کودکان کمتر از ۸ سال در صورت لزوم در به کار



بردن AED، استفاده از انواع دارای کاهنده دوز مخصوص کودکان توصیه می شود. اگر هیچ کدام در دسترس نبود AED بدون کاهش دهنده نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. دیده شده AED هایی که انرژی های بالا ایجاد می کنند نیز بدون اینکه آسیبی به میوکارد وارد کنند، به طور موفق در شیرخواران استفاده شده اند.

۲۱

احیاگرها باید ماساژ قلبی و دادن شوک را به گونه ای هماهنگ نمایند تا فاصله زمانی بین ماساژها و دادن شوک به حداقل برسد و دوباره احیا را با ماساژ قلبی بلا فاصله بعد از دادن شوک، ادامه دهند. AED ها این قابلیت را دارند که به احیا کننده هشدار دهنده تا ریتم را هر ۲ دقیقه مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار دهد.

احیا فقط با دست (فقط ماساژ)

احیا مناسب در شیرخوار و کودکان شامل هم ماساژ و هم تهویه است. در ایست قلبی با منشا تنفسی زمانی که ماساژ قلبی به همراه تنفس کمکی باشد، نتایج بهتری حاصل می شود. یک مطالعه بزرگ در اطفال نشان داد که احیا با ماساژ قلبی و تنفس دهان به دهان موثرتر از روش ماساژ به تنها بی است (در صورتی که ایست قلبی با منشا غیر قلبی باشد). بر عکس احیا به روش فقط ماساژ به اندازه روش ماساژ همراه با تنفس دهان به دهان در ایست های با منشا قلبی موثر بوده است. همچنین تنفس های کمکی در طی احیای ناشی از ایست قلبی با منشا تنفسی مهمتر از ایست هایی با منشا قلبی است. ایست های قلبی با منشا تنفسی در شیرخواران و نوزادان شایع ترین نوع ایست قلبی است، اما حتی در ایست های با منشا تنفسی، تهویه کمکی کمتری برای ایجاد یک نسبت تهویه به گردش خون مناسب مورد نیاز است زیرا برونو ده قلبی (در نتیجه جریان خون ریوی ایجاد شده) ناشی از ماساژ قلبی کم می باشد و یک تهویه مختصر برای اکسیژنه کردن آن کافی است.

در ایست های قلبی کودکان چنانچه احیاگر / احیاگران تمایلی به دادن تنفس کمکی نداشته و یا توانایی انجام آن را نداشته باشند، احیای فقط با ماساژ قلبی توصیه می شود. البته لازم به ذکر است که مطالعات نشان داده انجام احیا با ماساژ قلبی تنها با عواقب عصبی بدتری در ۳۰ روز بعد از احیا در مقایسه احیای همراه با تنفس کمکی همراه بوده است.

وسایل کمکی در تنفس

وسایل محافظ

در برخی موارد، بدليل نبود وسایل محافظ، انجام عملیات احیاگر (اعم از حرفة‌ای و یا غیرحرفة‌ای) به تاخیر افتاده، هر چند که استفاده از این وسایل محافظ، خطر کم انتقال عفونت را کاهش نداده است. این در حالی است که برخی از این وسایل می‌توانند مقاومت در مقابل جریان هوای افزایش دهند. در صورتی که از یک وسیله محافظ استفاده می‌کنید، در دادن تنفس‌های کمکی تاخیر نکنید. چنانچه هرگونه تاخیری در تهیه یک وسیله محافظ یا یک وسیله کمکی پیش‌بینی می‌شود، تنفس دهان به دهان را شروع نموده یا به روش ماساژ به تنها یی ادامه دهد.

تنفس با بگ (کیسه) و ماسک برای افراد حرفة‌ای

تنفس با بگ و ماسک یک روش احیای اساسی برای کارکنان حرفة‌ای است. این روش نیازمند آموزش، تمرین و بازآموزی‌های دوره‌ای متعاقب آن می‌باشد: انتخاب اندازه مناسب، باز کردن راه هوایی، برقراری یک تماس محکم بین ماسک و صورت، دادن تنفس‌های موثر و ارزیابی موثر بودن تنفس‌های کمکی.



از بگ‌های خود متسع شونده با حجم حداقل ۴۰۰ سی سی برای شیرخواران و کودکان کوچک تراستفاده کنید؛ زیرا بگ‌های با حجم کمتر ممکن است قادر به فراهم آوردن حجم جاری موثر نباشد یا زمان دم طولانی تری را در یک شیرخوار یا نوزاد ترم به همراه داشته باشد. ممکن است در کودکان بزرگ‌تر و نوجوانان برای برقراری یک تهويه کامل، بگ خود متسع شونده بالغین (۱۰۰۰ سی سی) مورد نیاز باشد.

یک بگ متسع شونده فقط هوای اتاق را تحويل می‌دهد مگر اینکه منبع اکسیژن اضافی به آن متصل شود. در صورت عدم استفاده از کیسه ذخیره، حتی اگر به میزان ۱۰ لیتر در دقیقه اکسیژن به کودک از طریق بگ و ماسک بدهیم، غلظت اکسیژنی که به بیمار می‌رسد، حداقل ۳۰ تا ۸۰ درصد خواهد بود که بستگی به حجم جاری و میزان حداکثر جریان دمی بیمار دارد. برای تحويل





اکسیژن با غلظت بالا (۶۰ تا ۹۵ درصد) باید یک کیسه ذخیره به بگ خود متسع شونده اضافه شود. در چنین حالتی جریان ۱۰ یا ۱۵ لیتر اکسیژن در دقیقه مورد نیاز خواهد بود. برای تحویل چنین درصدی از اکسیژن (۶۰ تا ۹۵ درصد) در حین استفاده از بگ بالغین باید جریان اکسیژن را حداقل در حد ۱۵ لیتر در دقیقه برقرار کنید.

۲۳

احتیاطات

احیاگران حرفه‌ای به ویژه هنگامی که یک راه هوایی پیشرفته برقرار می‌شود، تنفس‌های کمکی بیش از حد ایجاد می‌کنند. تهویه بیش از حد به دلایل زیر مضر خواهد بود:

- فشار داخل قفسه سینه را افزایش داده و در برگشت وریدی به قلب اختلال ایجاد می‌کند. این امر سبب کاهش بروز ده قلبی، جریان خون مغز و عروق کرونری می‌شود.
 - در بیمارانی که دچار انسداد راه‌های هوایی کوچک هستند، باعث احتباس هوا و باروتوما^۱ می‌گردد.
 - در بیمارانی که فاقد راه هوایی پیشرفتی می‌باشند، خطر رگورزیتاسیون^۲ و آسپیراسیون^۳ را افزایش می‌دهد.
- باید از تنفس کمکی بیش از حد اجتناب کنید. نیرو و حجم جاری موردنیاز را فقط به گونه‌ای فراهم نمایید که قفسه سینه بالا باید. هر تنفس را آهسته بدھید و بالا آمدن قفسه سینه را نگاه کنید.

اگر قفسه سینه بالا نیامد مجدداً بررسی نمایید

راه هوایی را باز کنید، درستی محکم بودن تماس بین ماسک و صورت را بررسی کنید (یا بین بگ و راه هوایی پیشرفتی) و مجدداً تنفس کمکی بدھید. از آنجایی که تهویه موثر با بگ و ماسک نیازمند مراحل پیچیده‌ای است این روش در احیای یک نفره توصیه نمی‌شود. کودکان مبتلا به انسداد راه هوایی یا بیمارانی که پذیرش^۴ ریوی کمی دارند، ممکن است نیازمند فشارهای دمی بالاتری برای ایجاد یک تهویه موثر

۱. آسیب بافت ریه ناشی از احتباس هوا در آلوئول‌ها و پره‌هوایی ریه که موجب پارگی آلوئول و خروج هوا از ریه داخل حفره قفسه سینه و عوارض بعدی آن می‌شود

۲. بازگشت غیر ارادی محتویات معده به حلق

۳. وارد شدن محتویات دهان و حلق به نای و ریه

compliance. ۴

باشند (تا حدی که باعث بالا آمدن قفسه شود). دریچه آزاد کننده فشاری که در سیستم بگ و ماسک طراحی شده است، ممکن است مانع از ایجاد یک حجم جاری کافی در این بیماران گردد. با وسایل بگ - ماسک موجود، قادر خواهید بود این اثر دریچه های کاهنده فشار آنها را دور زده و در صورت لزوم برای ایجاد تهویه مناسب فشارهای بالا ایجاد کنید.

۲۴



تهویه بگ - ماسک (دو نفره)

اگر احیاکنندگان ماهری در دسترس باشند، روش احیای دو نفره نسبت به روش احیای یک نفره در برقراری تهویه موثر با بگ و ماسک موفق تر است. تکنیک تهویه بگ-ماسک دو نفره در مواردی که انسداد راه هوایی قابل توجه، ظرفیت ریوی ناچیز یا اشکال در برقراری یک اتصال محکم بین ماسک و صورت وجود دارد، می تواند مورد نیاز باشد. یک احیاکننده از هر دو دست جهت هم باز کردن راه هوایی و هم برقراری یک تماس محکم بین صورت و ماسک استفاده می کند در حالی که دیگری بگ را فشار می دهد. هر دو احیاکننده باید قفسه سینه رانگاه کنند تا از بالا آمدن آن اطمینان حاصل نمایند. با توجه به اینکه احیای بگ-ماسک دو نفره می تواند موثرتر باشد، مراقب باشید که از دادن حجم های خیلی زیاد که منجر به تهویه بیش از حد می گردد، اجتناب کنید.

باد شدن معده و فشردن کریکوئید

باد شدن معده می تواند با تهویه موثر تداخل ایجاد کند و باعث رگوژیتاسیون^۱ گردد.

برای به حداقل رساندن باد شدن معده، از ایجاد فشارهای دمی بیش از حد اجتناب نمایید. این کار را با برقراری هر تنفس طی **حدود یک ثانیه** انجام دهید. فشردن کریکوئید می تواند مد نظر قرار بگیرد؛ اما فقط در



۱. بازگشت غیرارادی محتویات معده به حلق.



صورتی قابل انجام خواهد بود که قربانی پاسخ گونباشد و یک احیاگر حرفه‌ای اضافی در دسترس باشد. از فشاربیش از حد برروی کریکوئید اجتناب نمایید. زیرا می‌تواند موجب بسته شدن تراشه گردد.

۲۵

تجویز اکسیژن

بررسی‌های متعدد تئوری و حیوانی موید این نکته است که تجویز اکسیژن ۱۰۰ درصد، احتمالاً عوارض نامطلوبی به همراه خواهد داشت. عوارض اکسیژن طی احیا فقط در نوزادان مطالعه شده است. لذا تازمانی که اطلاعات جدیدتری در دسترس قرار گیرد، منطقی است که احیاگران حرفه‌ای در طی احیا از اکسیژن ۱۰۰ درصد استفاده کنند. وقتی گردش خون به حالت طبیعی برگشت، میزان اشباع اکسیژن را مانیتور کنید. منطقی است که در این حالت میزان تجویز اکسیژن را به گونه‌ای تنظیم نمایید که میزان اشباع هموگلوبین مساوی یا بیش از ۹۴ درصد بماند. باید غلظت اکسیژن دمی را از یک اشباع ۱۰۰ درصد بطور تدریجی کم کنیم مشروط به اینکه میزان اشباع اکسیژن هموگلوبین در حد ۹۴ درصد و یا بیشتر باقی بماند. از آنجا که تجویز اکسیژن خشک سبب خشک شدن مخاط ها و غلیظ شدن ترشحات می‌گردد، باید هر وقت امکان پذیر شد اکسیژن مرتبط شود.

ماسک‌های اکسیژن

ماسک‌های ساده اکسیژن توانایی این را دارند تا غلظت اکسیژنی معادل ۳۰ تا ۵۰ درصد را در بیماردارای تنفس خودبخودی، فراهم سازند. برای فراهم آوری درصد های بالاتر اکسیژن باید از یک ماسک با بگ ذخیره‌ای به همراه جریان اکسیژن حدود ۱۵ لیتر در دقیقه به طوری که بگ ذخیره باد شود، استفاده کنیم.



کانول بینی

برای کودکانی که تنفس خود بخودی دارند، کانول‌های بینی سایز اطفال و شیرخواران برای تجویز اکسیژن مناسب است. غلظت اکسیژن تجویزی با این روش محدود بوده و بستگی به اندازه کودک، تعداد تنفس و تلاش‌های تنفسی وی دارد.



انسداد راه هوایی با جسم خارجی (خفگی)


مرگ‌های ناشی از خفگی به علت جسم خارجی در گروه سنی کودکان نسبت به سایر گروه‌های سنی شیوع بالاتری دارد. بیش از ۹۰٪ مرگ‌های ناشی از خفگی جسم خارجی در اطفال، در کودکان زیر ۵ سال اتفاق می‌افتد؛ ۶۵ درصد این قربانیان شیرخوار می‌باشند. مایعات شایع ترین علت خفگی در شیرخواران است، در حالی که بادکنک، اشیا ریز، و غذاها (آب‌نبات، مغزها، انگور، تکه‌های کوچک اسباب بازی) شایع ترین علل انسداد راه هوایی در اثر جسم خارجی در کودکان را تشکیل می‌دهند. علائم انسداد راه هوایی با جسم خارجی شامل شروع ناگهانی مشکل تنفسی همراه با سرفه، اوغ زدن، استریدور، یا خس خس می‌باشد. شروع ناگهانی یک مشکل تنفسی در فقدان تب و دیگر علائم تنفسی (سرفه قبلی، احتقان بینی)، در ابتدا مطرح کننده انسداد راه هوایی با جسم خارجی است تا اینکه یک علت عفونی برای آن مطرح باشد.

رفع انسداد راه هوایی

جسم خارجی می‌تواند موجب انسداد خفیف تا شدید راه هوایی شود. در انسداد خفیف کودک می‌تواند سرفه کرده و از خود صدای ای تولید کند. زمانی که انسداد شدید است، قربانی قادر به سرفه کردن و یا تولید هیچ صدایی از خود نمی‌باشد. اگر انسداد راه هوایی با جسم خارجی خفیف است، مداخله نکنید. کودک را از نظر پیشرفت به طرف انسداد راه هوایی شدید تحت نظر بگیرید و به او اجازه دهید با سرفه کردن راه هوایی خود را پاک نماید.


اگر انسداد راه هوایی با جسم خارجی شدید است (قربانی قادر به تولید هیچ صدایی نیست) بایستی برای رفع انسداد دست بکار شوید: اگر قربانی کودک است، قسمت زیردیافراگمی شکم او را فشار دهید (ضربات زیر شکمی دیافراگمی) تا اینکه جسم خارجی بیرون رانده شده و یا قربانی پاسخی به تحریکات ندهد.

اگر قربانی شیرخوار است دوره‌های پنج ضربه به پشت و متعاقب آن پنج بار فشدن قفسه سینه را تا زمانیکه جسم خارجی بیرون رانده شده و یا قربانی بیهوش شود ادامه



دهید. در شیرخواران، فشار بروی شکم را به دلیل کبد نسبتاً بزرگ که بطور کامل توسط دندنه‌ها حفاظت نمی‌شود، انجام نمی‌دهیم.

اگر کودک بیهوش شود، عملیات احیا را با ماساژ قلبی (بدون اینکه نبض را چک کنید) شروع کنید. بعد از ۳۰ ماساژ قلبی، راه هوایی را باز کنید. اگر جسم خارجی را می‌بینید آن را خارج سازید ولی از جستجوی کورکورانه دهان با حرکات پارویی انگشت پرهیز کنید؛ چرا که ممکن است با این کار جسم خارجی را بیشتر به سمت حلق براند و یا سبب آسیب حلق شوید. دو بار تنفس بدھید و دوره‌های ماساژ قلبی و تنفس دادن را تا زمانی که جسم خارجی بیرون شود ادامه دهید. بعد از دو دقیقه، اگر هنوز کسی به اورژانس خبر نداده باشد، اورژانس را خبر کنید.



حادثه

اصول احیای پایه برای کودک مصدوم مشابه حالتی است که برای کودک بدحال گفته شد. اما بهر حال برخی جوانب آن از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. جنبه‌های مهم احیا در کودکان قربانی حادثه:

۲۸

- پیش بینی انسداد راه هوایی در اثر تکه های دندان، خون یا سایر موارد را بکنید.
- در صورت نیاز اگر که ساکشن در دسترس دارید، از ساکشن استفاده کنید.
- کلیه خونریزی های خارجی را با اعمال فشار مستقیم روی آنها متوقف نمایید.
- زمانی که بر اساس مکانیسم آسیب وارده احتمال صدمه دیدن ستون فقرات وجود دارد، حرکت ستون فقرات گردنی و جابجایی های سرو گردن را به حداقل برسانید.
- اگر دوا حیاگر حضور داشته باشند، یک نفر می‌تواند با کمک دست ها حرکت ستون فقرات گردنی را محدود کند، در حالیکه احیاگر دیگر راه هوایی را باز می‌کند.
- برای محدود کردن حرکت ستون فقرات، حداقل ران ها، لگن و شانه های مصدوم را به تخته بی حرکت کننده، محکم کنید.
- در صورت امکان کودک مبتلا به آسیب های جدی را به یک مرکز ترومای متبحر در زمینه کودکان ارجاع دهید.



غرق شدگی

۲۹ عواملی چون طول مدت قرارگیری در زیرآب، دمای آب، سرعت عمل و کیفیت ارائه عملیات احیا، تعیین کننده عاقبت غرق شدگی می‌باشند. مواردی از بقای شیرخواران با وضعیت عصبی سالم، حتی پس از غوطه ورشدن طولانی مدت در آب‌های سرد دیده شده است. احیا را با خارج‌سازی اینمن و هرچه سریعتر قربانی از آب شروع کنید. اگر آموزش ویژه دیده‌اید، تنفس را مادامی که قربانی درون آب قرار دارد، شروع کنید. این کار نباید موجب تاخیر در خارج‌سازی قربانی از آب شود. از دادن ماساژ قلبی در آب خودداری کنید.

پس از خارج کردن قربانی از آب، عملیات احیا را در صورتی که قربانی بیهوش بوده و نفس نمی‌کشد شروع کنید. اگر تنها هستید، قبل از خبر کردن اورژانس و دریافت یک AED، پنج دوره ماساژ و تنفس بدھید (تقریباً دو دقیقه). اگر دو نفر برای احیا حضور دارید، فوراً نفر دوم را برای فراخوانی اورژانس و تهیه یک AED بفرستید در حالیکه خودتان عملیات احیا را ادامه می‌دهید.

ضمیمه:

مراحل استفاده از AED

۳۰

- دستگاه AED را روشن کنید.
- مطابق دستورالعمل دستگاه عمل نمایید.
- به منظور تحلیل ریتم و دادن شوک عملیات احیا را در صورت امکان متوقف کنید و از قربانی فاصله بگیرید.



- بلا فاصله بعد از شوک ماساژ قلبی را شروع کنید. وقفه های ماساژ قلبی را به حداقل برسانید.




- احیاگران بایستی هماهنگی لازم بین ماساژ قلبی و دادن شوک را به منظور ایجاد حداقل وقفه زمانی بین آنها و ادامه عملیات احیا با ماساژ قلبی، بلا فاصله بعد از تخلیه شوک، انجام دهند. هر دو دقیقه وضعیت را به منظور تحلیل مجدد ریتم

قلبی به احیاگر اعلان می نماید. به طور ایده‌آل دادن شوک بایستی با حداقل وقفه زمانی بعد از ماساژ قلبی صورت پذیرد.



۳۱



* در صورت عدم وجود AED (عدم امکان ارزیابی ریتم)، CPR را تا رسیدن اورژانس ادامه دهید

الگوریتم احیاپایه کودک برای کارکنان بخش سلامت (وقتی یک احیاگر حضور ندارد)

۳۲

